

FORMAS DE PREVENIR EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO A TODAS LAS EDADES

El cáncer de cuello uterino puede prevenirse con la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), con pruebas de detección del cuello uterino de rutina y oportunas, y con el tratamiento temprano.




+9 años

Vacúnate contra el VPH.

Las vacunas contra el VPH se pueden administrar a partir de los **9 años de edad en todos los niños.**


40 años & 50 años

Su riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino aún está presente si tiene cuello uterino. **Continúe haciéndose pruebas regulares de detección del cáncer de cuello uterino.**



20 años


Si no se vacunó previamente contra el **VPH**, hable con su proveedor de atención médica. Comience con la detección regular **del cáncer de cuello uterino.**



+60 años

Continúe con las pruebas de detección regulares.

Después de los 65 años, su proveedor de atención médica podría decirle que puede dejar de realizarse la prueba de detección si nunca ha tenido una condición precancerosa cervical y cumple con criterios específicos.



30 años

Continúe haciéndose **las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino** según la recomendación de su proveedor de atención médica. Si sus resultados son normales, esto podría significar realizarse pruebas cada 3 a 5 años.

Sus resultados

Si los resultados de sus pruebas de detección del cáncer de cuello uterino son anormales, su proveedor de atención médica se lo informará. Debe coordinar su próximo paso lo antes posible. Es posible que necesite pruebas de detección o tratamientos más frecuentes en función de sus antecedentes médicos individuales. El tratamiento puede eliminar una condición precancerosa y prevenir el desarrollo del cáncer de cuello uterino.



Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
Administración de Recursos y Servicios de Salud
Agosto de 2024

HRSA
Office of Women's Health